

**ACTUALITE CONGRES**

## Fibromyalgie en Europe : l'Italie arrive en tête

Publié le 11/02/2008

Les résultats d'une vaste étude ayant évalué la prévalence de la fibromyalgie dans cinq pays européens : l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, ont été présentés au cours du 20e congrès français de rhumatologie, à Paris.

Cette étude a été réalisée à partir des réponses au *London Fibromyalgia Epidemiological Study Screening Questionnaire*, soumis à 1 125 patients venus consulter dans 8 services hospitaliers de rhumatologie, quel que soit le motif de consultation, ainsi qu'à un échantillon de 4 517 sujets, représentatif de la population générale âgée de plus de 15 ans.

Les critères de l'*American College of Rheumatology* ont été appliqués pour confirmer le diagnostic de fibromyalgie, et l'étude de prévalence s'est appuyée sur les réponses au questionnaire intéressant la douleur, ou la douleur et la fatigue.

### Une prévalence comparable à celle d'Amérique du Nord

Pour l'ensemble de la population d'étude, la prévalence est de 4,6 % lorsque l'étude repose sur le seul questionnaire intéressant la douleur (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 4,0 à 5,2), et de 2,8 % (IC95 de 2,3 à 3,3) lorsque le questionnaire douleur et fatigue est pris en compte.

En se fondant sur le questionnaire douleur et fatigue, la prévalence par pays a été estimée, par ordre de prévalence croissante, à : 1,4 % en France (2 % chez les femmes, 0,7 % chez les hommes), 2,3 % en Espagne (3,3 % chez les femmes, 1,3 % chez les hommes), 3,2 % en Allemagne (3,9 % chez les femmes, 2,5 % chez les hommes), 3,6 % au Portugal (5,2 % chez les femmes, 1,8 % chez les hommes), et 3,7 % en Italie (5,5 % chez les femmes, 1,6 % chez les hommes). Seule la différence entre la France et l'Italie s'est avérée statistiquement significative.

Cette étude, qui évalue à au moins 6 millions le nombre d'adultes atteints de fibromyalgie dans les cinq pays étudiés, met en évidence une prévalence de la fibromyalgie dans ces pays européens comparable à celle des États-Unis et du Canada, évaluée entre 2 et 4 %, et confirme la prédominance féminine de l'affection.

Dr Julie Perrot

*Bannwarth B et coll. : Prévalence de la fibromyalgie en Europe. 20e Congrès français de rhumatologie (Paris) : 2-5 décembre 2007.*

Copyright © Len

### Vos réactions

[Réagir à cet article](#)